

## ДВЕ ЗАДАЧИ ЗА ПРАВИЛЕН ШЕСТАГОЛНИК

Во овој напис ќе разгледаме две познати, но занимливи задачи за правилен шестаголник.

**Задача 1.** На секоја страна на правилен шестаголник  $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$  како над хипотенуза, од внатрешната страна е конструиран по еден рамнокрак правоаголен триаголник. Темињата  $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6$  на овие триаголници се темиња на внатрешен шестаголник (цртеж 1).

Докажи дека шестаголникот  $C_1C_2C_3C_4C_5C_6$  е правилен и пресметај ја неговата плоштина, ако е позната страната  $a$  на шестаголникот  $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ .

**Решение.** Темето  $C_1$  лежи на симетралата на страната  $A_1A_2$ , па затоа  $\sphericalangle C_1SA_1 = 30^\circ$ . Слично  $\sphericalangle C_6SA_1 = 30^\circ$ , па значи  $\sphericalangle C_1SC_6 = 60^\circ$ . Аналогно

$$\begin{aligned} \sphericalangle C_1SC_2 &= \sphericalangle C_2SC_3 = \sphericalangle C_3SC_4 \\ &= \sphericalangle C_4SC_5 = \sphericalangle C_5SC_6 = 60^\circ. \end{aligned}$$

Од друга страна

$$\overline{C_1S} = \overline{M_1S} - \overline{M_1C_1} = \frac{a\sqrt{3}}{2} - \frac{a}{2} = \frac{a}{2}(\sqrt{3} - 1).$$

Аналогно

$$\overline{C_2S} = \overline{C_3S} = \overline{C_4S} = \overline{C_5S} = \overline{C_6S} = \frac{a}{2}(\sqrt{3} - 1).$$


Според тоа, триаголниците  $C_1SC_2, C_2SC_3, C_3SC_4, C_4SC_5, C_5SC_6, C_6SC_1$  се рамнокраки и аголот меѓу крците е еднаков на  $60^\circ$ , а значи тие се рамнострани. Значи

$$\overline{C_1C_2} = \overline{C_2C_3} = \overline{C_3C_4} = \overline{C_4C_5} = \overline{C_5C_6} = \overline{C_6C_1} = \frac{a}{2}(\sqrt{3} - 1)$$

и

$$\sphericalangle C_1C_2C_3 = \sphericalangle C_2C_3C_4 = \sphericalangle C_3C_4C_5 = \sphericalangle C_4C_5C_6 = \sphericalangle C_5C_6C_1 = \sphericalangle C_6C_1C_2 = 60^\circ.$$

Конечно, шестаголникот  $C_1C_2C_3C_4C_5C_6$  има еднакви страни и еднакви агли, т.е. тој е правилен и неговата страна е  $b = \frac{a}{2}(\sqrt{3} - 1)$ . Според тоа, неговата плоштина е



Цртеж 1

$$P_1 = 6 \frac{b^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \left(\frac{a}{2}\right)^2 (\sqrt{3}-1)^2 = \frac{3a^2}{4} (2\sqrt{3}-3). \blacksquare$$

**Забелешка 1. а)** Плоштината  $P_2$  на делот од надворешниот шестаголник, кога од него ќе се исече внатрешниот шестаголник е  $P_2 = P - P_1$ , каде  $P = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2}$ . Значи

$$P_2 = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2} - \frac{3a^2}{4} (2\sqrt{3}-3) = \frac{9a^2}{4}.$$

**б)** Плоштината на шесткраката ѕвезда  $A_1C_1A_2C_2A_3C_3A_4C_4A_5C_5A_6C_6$  ја добиваме кога од плоштината на надворешниот шестаголник ќе ја одземеме плоштината на шесте рамнокраки правоаголни триаголници  $A_1C_1A_2$ ,  $A_2C_2A_3$ ,  $A_3C_3A_4$ ,  $A_4C_4A_5$ ,  $A_5C_5A_6$ ,  $A_6C_6A_1$ . Секој од овие триаголници има хипотенуза  $a$  и висина спуштена кон хипотенузата  $\frac{a}{2}$ , па затоа нивната вкупна плоштина е  $P' = \frac{6a^2}{4}$ . Според тоа, плоштината на ѕвездата е


$$P_3 = P - P' = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2} - \frac{3a^2}{2} = \frac{3a^2}{2} (\sqrt{3}-1).$$

**Задача 2.** На секоја страна на правилен шестаголник  $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ , како мад хипотенуза, од надворешната страна е конструиран по еден рамнокрак правоаголен триаголник. Темињата на правите агли  $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$  на овие триаголници се темиња на друг надоврешен шестаголник (цртеж 2).

Докажи дека шестаголникот  $B_1B_2B_3B_4B_5B_6$  е правилен и пресметај ја неговата плоштина  $P_4$ , ако е позната страната  $a$  на шестаголникот  $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ .

**Решение.** Нека со  $S$  го означиме центарот на симетрија на шестаголникот  $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ . Ако со  $M_1$  и  $M_2$  ги означиме средините на  $A_1A_2$  и  $A_2A_3$ , тогаш  $A_1A_2 \perp B_1M_1$  и  $A_1A_2 \perp SM_1$ , т.е. точките  $B_1, M_1$  и  $S$  се колинеарни и притоа важи

$$\overline{B_1S} = \overline{M_1S} + \overline{M_1B_1} = \frac{a\sqrt{3}}{2} + \frac{a}{2} = \frac{a}{2} (\sqrt{3}+1).$$



Цртеж 2

Аналогно се докажува дека  $\overline{B_2S} = \overline{B_3S} = \overline{B_4S} = \overline{B_5S} = \overline{B_6S} = \frac{a}{2}(\sqrt{3} + 1)$ . Од друга страна  $\sphericalangle B_1SB_2 = \sphericalangle B_1SA_2 + \sphericalangle A_2SB_2 = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$ , т.е. триаголникот  $B_1SB_2$  е рамностран. Слично докажуваме дека триаголниците  $B_2SB_3$ ,  $B_3SB_4$ ,  $B_4SB_5$ ,  $B_5SB_6$ ,  $B_6SB_1$  се рамнострани. Значи

$$\overline{B_1B_2} = \overline{B_2B_3} = \overline{B_3B_4} = \overline{B_4B_5} = \overline{B_5B_6} = \overline{B_6B_1} = \frac{a}{2}(\sqrt{3} + 1)$$

и

$$\sphericalangle B_1B_2B_3 = \sphericalangle B_2B_3B_4 = \sphericalangle B_3B_4B_5 = \sphericalangle B_4B_5B_6 = \sphericalangle B_5B_6B_1 = \sphericalangle B_6B_1B_2 = 60^\circ.$$

Конечно, шестаголникот  $B_1B_2B_3B_4B_5B_6$  има еднакви страни и еднакви агли, т.е. тој е правилен и неговата страна е  $b = \frac{a}{2}(\sqrt{3} + 1)$ . Според тоа, неговата плоштина е

$$P_4 = 6 \frac{b^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \left(\frac{a}{2}\right)^2 (\sqrt{3} + 1)^2 = \frac{3a^2}{4} (2\sqrt{3} + 3). \blacksquare$$

**Забелешка 2. а)** Плоштината  $P_5$  на делот од надворешниот шестаголник, кога од него ќе се исече внатрешниот шестаголник е  $P_5 = P_4 - P$ , каде  $P = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2}$ . Значи  $P_5 = \frac{3a^2}{4} (2\sqrt{3} + 3) - \frac{3\sqrt{3}a^2}{2} = \frac{9a^2}{4}$ .

**б)** Плоштината на шесткраката ѕвезда  $A_1B_1A_2B_2A_3B_3A_4B_4A_5B_5A_6B_6$  ја добиваме кога на плоштината на шестаголникот  $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$  ќе ги додадеме плоштините на шесте рамнокраки правоаголни триаголници  $A_1B_1A_2$ ,  $A_2B_2A_3$ ,  $A_3B_3A_4$ ,  $A_4B_4A_5$ ,  $A_5B_5A_6$ ,  $A_6B_6A_1$ . Секој од овие триаголници има хипотенуза  $a$  и висина спуштена кон хипотенузата  $\frac{a}{2}$ , па затоа нивната вкупна плоштина е  $P' = \frac{6a^2}{4}$ . Според тоа, плоштината на ѕвездата е

$$P_6 = P + P' = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2} + \frac{3a^2}{2} = \frac{3a^2}{2} (\sqrt{3} + 1).$$

**Забелешка 3.** Задачите 1 и 2 може да се обопштат, така што наместо рамнокраки правоаголни триаголници, се конструираат произволни рамнокраки триаголници. Притоа, во задачата 1 кракот на констрираниот триаголник мора да биде помал од  $a$ , а во задачата 2 нема никакво ограничување. Обиди се некои од овие обопштувања самостојно да ги направеш. На пример, за  $c = \frac{2}{3}a$  и  $c = \frac{3}{4}a$ .