

БМО 1999

1. Даден е остроаголен триаголник ABC . Нека D е средина на помалиот лак BC на кружницата опишана околу $\triangle ABC$. Точките E и F се симетрични на точката D соодветно во однос на правата BC и центарот на опишаната кружница околу $\triangle ABC$. Нека K е средина на отсечката EA .

а) Докажи дека кружницата која минува низ средините на страните на $\triangle ABC$ ја содржи точката K .


б) Докажи дека правата која минува низ точката K и средината на страната BC е нормална на правата AF .

Решение. а) Нека со A', B', C' соодветно ги означиме средините на страните BC, CA, AB . Отсечките KB' и KC' се средни линии на триаголниците AEC и AEB , па затоа

$$\begin{aligned}\angle C'KB' &= \angle BEC = \angle CDB = 180^\circ - \angle BAC \\ &= 180^\circ - \angle B'A'C',\end{aligned}$$

што значи дека точката K лежи на кружницата $A'B'C'$.

б) Отсечката KA' е средна линија во триаголникот EAD , па затоа $KA' \parallel AD$. Понатаму, DF е дијаметар на кружницата ABC па затоа $AD \perp AF$. Конечно, од $KA' \parallel AD$ и $AD \perp AF$ следува $KA' \perp AF$.



2. Нека $p > 2$ е прост број таков што $3 \mid p-2$. Докажи, дека најмногу $p-1$ елементи на множеството

$$S = \{y^2 - x^3 - 1 \mid x, y \in \mathbb{Z}, 0 \leq x, y \leq p-1\}$$

се деливи со p .

Решение. Од $p \equiv 2 \pmod{3}$ следува дека броевите $0^3, 1^3, \dots, (p-1)^3$ даваат различни остатоци при делење со p . Навистина, ако $a^3 \equiv b^3 \pmod{p}$, тогаш со степенување на $\frac{p-2}{3}$ добиваме $a^{p-2} \equiv b^{p-2} \pmod{p}$. Но, $a^{p-1} \equiv b^{p-1} \pmod{p}$, па затоа $a \equiv b \pmod{p}$. Според тоа, за секој $y \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ постои точно еден елемент $s_y = y^2 - x^3 - 1 \in S$ делив со p . Меѓутоа,

$$s_1 = 1^2 - 0^3 - 1 = 0 = 3^2 - 2^3 - 1 = s_3,$$

па затоа меѓу елементите $s_0, s_1, \dots, s_{p-1}$ има најмногу $p-1$ различни.

3. Нека M, N, P се подножјата на нормалите повлечени од тежиштето G на остроаголниот $\triangle ABC$ соодветно на страните AB, BC, CA . Докажи дека важи

$$\frac{4}{27} < \frac{P_{MNP}}{P_{ABC}} \leq \frac{1}{4}. \quad (1)$$

Решение. Ќе ги користиме стандардните ознаки a, b, c за страните на триаголникот соодветно наспроти темињата A, B, C , α, β, γ за соодветните агли и h_a, h_b, h_c за висините. Од

$$\overline{GM} = \frac{1}{3} h_c = \frac{1}{3} a \cos \beta, \overline{GN} = \frac{1}{3} h_a = \frac{1}{3} c \cos \beta \text{ и } \angle MGN = 180^\circ - \beta$$

следува

$$P_{GMN} = \frac{1}{18} h_c h_a \sin \beta = \frac{1}{18} ac \sin^3 \beta = \frac{1}{9} P_{ABC} \sin^2 \beta.$$

Слично,

$$P_{GNP} = \frac{1}{9} P_{ABC} \sin^2 \gamma \text{ и } P_{GPM} = \frac{1}{9} P_{ABC} \sin^2 \alpha.$$

Според тоа, имаме

$$P_{MNP} = P_{GMN} + P_{GNP} + P_{GPM} = \frac{1}{9} P_{ABC} (\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma). \quad (2)$$

Но,

$$K = \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = \sin^2 \alpha + 1 - \frac{\cos 2\beta + \cos 2\gamma}{2} = 1 + \sin^2 \alpha + \cos \alpha \cos(\beta - \gamma),$$

па како $\cos \alpha < \cos(\beta - \gamma) \leq 1$ следува

$$2 = 1 + \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha < K \leq 1 + \sin^2 \alpha + \cos \alpha = 2 + \cos \alpha - \cos^2 \alpha \leq \frac{9}{4}. \quad (3)$$

Конечно, неравенствата (1) следуваат од равенството (2) и неравенствата (3).

4. Дадена е низата $0 \leq x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots$ цели броеви таква што за секој $k \geq 0$ бројот на членовите кои не се поголеми од k е конечен (тој број да го означиме со y_k). Докажи дека за секои природни броеви m и n важи

$$\sum_{i=0}^n x_i + \sum_{j=0}^m y_j \geq (n+1)(m+1).$$

Решение. Да ги обележиме сите точки (i, j) , $i, j \geq 0$ на целобројната решетка во рамнината за кои важи $j < x_i$. За дадено i , бројот на обележените точки (i, j) е еднаков на x_i , па така во множеството $S = \{(i, j) \mid 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m\}$

има најманогу $\sum_{i=0}^n x_i$ обележени точки. Од друга страна, за дадено j , необележени точки (i, j) за кои $i \geq 0$ има точно y_j , па така во множеството S има

$\sum_{j=0}^m y_j$ необележени точки. Но, сите точки од множеството S се обележени

или не се обележени, па затоа $\sum_{i=0}^n x_i + \sum_{j=0}^m y_j$ не е помал од бројот на точките на множеството S , т.е. од $(n+1)(m+1)$.